arXiv:1103.5000v1 [math.CA] 25 Mar 2011

FORMULES EXPLICITES DU NOYAU DE LA CHALEUR SUR L'ESPACE PROJECTIF QUATERNIONIQUE

A. HAFOUD

RÉSUMÉ. Dans cette Note, on donne une représentation intégrale et le dévellopement assymptotique explicites du noyau de la chaleur $H_n(t;x,y)$ associé au Laplacien de Fubini-Study sur l'espace projectif quaternionique $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$, en terme de la fonction théta de Jacobi ϑ_2 et des polynômes de Jacobi du type $P_l^{(2n-1,1)}(\cos(2d))$.

Abstract. In this note we give an explicit integral representation and an expanssion for the heat kernel $H_n(t;x,y)$ associated to Fubini-Study Laplacians on quaternionic projective spaces $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$, $n \geq 1$. This was possible by establishing a real integral representation formula for Jacobi polynomials of type $P_l^{(2n-1,1)}(\cos(2d))$.

1 ABRIDGED ENGLISH VERSION

Let $M = G/H$ be a rank one compact riemannian symmetric space (i.e., spheres, complex projective spaces, quaternionic projective spaces), Δ_M the Laplace-Beltrami operator on M and $E_M(t;x,y)$ the associated heat kernel solving the following heat equation on M :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}E_M(t;x,y) = \Delta_M E_M(t;x,y), & t>0,\ x,y \in M \\ \lim_{t\to 0^+}\int_M E_M(t;x,y)f(y)dy = f(x), & f \in \mathcal{C}^\infty(M) \end{cases}.$$

Then it is well known that the above heat kernel $E_M(t;x,y)$ depends only on $t>0$ and on the geodesic distance $d := d(x,y)$ of the rank one compact symmetric space M, i.e., $E_M(t;x,y) = F(t,d)$. Hence it becomes natural to seek an explicit formula for the function $F(t,d)$.For the case $M = \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$, we have established the following explicit formulas for the heat kernel $Q_n(t,d) := Q_n(t;x,y)$ associated to Fubini-Study Laplacian on complex projective space $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ (see [5]) :

$$Q_n(t;d) = \frac{e^{n^2 t}}{2^{n-2}\pi^{n+1}}\int_d^{\pi/2}\frac{-d(cos(u))}{\sqrt{\cos^2(d)-\cos^2(u)}}\left[-\frac{1}{\sin(u)}\frac{d}{du}\right]^n(\theta_{n+1}(t;u)) \tag{1.1}$$

$$Q_n(t;d) = \frac{1}{\pi^n}\sum_{l=0}^{+\infty}(2l+n)\frac{(l+n-1)!}{l!}e^{-4l(l+n)t}P_l^{(n-1,0)}(\cos(2d)), \tag{1.2}$$

where $d := d(x,y)$ is the geodesic distance on $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ and $\theta_{n+1}(t;u)$ is the function given by :

$$\theta_{n+1}(t;u) := \sum_{l=0}^{+\infty} e^{-4t(l+n/2)^2}\cos(2l+n)u; \quad 0 \leq d < \pi/2.$$

In this Note, we give an integral representation and an expansion of the heat kernel $H_n(t,d)$ associated to the Fubini-Study Laplacian on the quaternionic projective space $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$. Namely, we have :

Theorem 1.1. *Let $n \geq 1$. Then, the heat kernel $H_n(t,d)$ associated to the Fubini-Study Laplacian on the quaternionic projective space $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ is given by the two following formulas :*

$$i) \quad H_n(t;d) = \frac{e^{(2n+1)^2 t}}{2^{2n-2}\pi^{2n+1}} \int_d^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos^2(d) - \cos^2(u)}}{\cos^2(d)} \tag{1.3}$$

$$\times \left[-\frac{1}{\sin(u)} \frac{d}{du} \right]^{2n+1} [\theta_{2n+2}(t;u)] \, sin(u) du \tag{1.4}$$

$$ii) \quad H_n(t;d) = \frac{1}{\pi^{2n}} \sum_{l=0}^{+\infty} (2l+2n+1) \frac{(l+2n)!}{(l+1)!} e^{-4l(l+2n+1)t} P_l^{(2n-1,1)}(\cos(2d)), \tag{1.5}$$

where the function $\theta_{2n+2}(t;u)$ is given by :

$$\theta_{2n+2}(t;u) := \sum_{l=0}^{+\infty} e^{-4t(l+n+1/2))^2} \cos(2l+2n+1)u.$$

Method of the proof :

(i) relies essentially on an explicit integral representation of the heat kernel on the complex projective space $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$ (see [5]), and

(ii) is based on i) of Theorem 1.1 and an real integral representation of the Jacobi polynomials of type $P_l^{(2n-1,1)}(x)$.

To end this Abridged English version we make the following remarks :

Remark 1.1. *The function $\theta_{2n+2}(t;x)$ above is related to the classical Jacobi function $\vartheta_2(z,\tau)$ ([7, p.371]). More precisely we have :*

$$\theta_{2n+2}(t;x) = \sum_{l=n}^{\infty} e^{-4t(l+1/2))^2} \cos(2l+1)x = \frac{1}{2}\vartheta_2\left(\frac{x}{\pi}, \frac{4it}{\pi}\right) - \sum_{l=0}^{n-1} e^{-4t(l+1/2))^2} \cos(2l+1)x.$$

Remark 1.2. *Note that the kernels $Q_n(t,d)$ and $H_n(t,d)$ can be given by an unified formula (see French version).*

2 Introduction et énnoncé des résultats

Soit $\mathbb{C}$ le corps des nombres complexes et $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$ la variéte projective complexe de $\mathbb{C}^{2n+2}$ et $\mathbb{H} = \mathbb{C} + \mathbb{C}j \approx \mathbb{C}^2$ le corps des nombres quaternioniques et $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ la variéte projective quaternionique de $\mathbb{H}^{n+1}$, comme $\mathbb{C}^{2n+2}$ peut s'identifier à $\mathbb{H}^{n+1}$, on peut alors considerer la projection π donnée par :

$$\pi : \mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{P}^n(\mathbb{H}).$$

$$[z_0 : z_1 : ..... : z_{2n+1}] \longrightarrow [z_0 + z_1 j : ..... : z_{2n} + z_{2n+1} j].$$

La varieté projective complexe $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$ étant munie de sa métrique canonique de Fubini-Study ds^2_{FS} et $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ est munie de sa métrique canonique notée encore ds^2_{FS} de sorte que π soit une submersion riemannienne dont toutes les fibres $(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}); ds^2_{FS})$ sont totalement géodésiques. Si $\Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{C})}$ et $\Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})}$ désignent respectivement les Laplaciens sur $(\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C}); ds^2_{FS})$ et $(\mathbb{P}^n(\mathbb{H}); ds^2_{FS})$, on sait que la relation d'entrelacement suivante : $\pi^* \circ \Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})} = \Delta_{\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})} \circ \pi^*$ a lieu (voir [2]) pour la submersion riemannienne donnée par la fibration de Hopf :

$$(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}); ds^2_{FS}) \hookrightarrow (\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C}); ds^2_{FS}) \xrightarrow{\pi} (\mathbb{P}^n(\mathbb{H}); ds^2_{FS}). \tag{2.1}$$

Dans cette Note, on donne une représentation intégrale et un dévellopement assymptotique de ce qu'on appelle le noyau de diffusion sur $(\mathbb{P}^n(\mathbb{H}), ds^2_{FS})$, i.e., $H_n(t;x,y)$ solution du problème de la chaleur associé à $\Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})}$ sur l'espace $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} H_n(t;x,y) = \Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})} H_n(t;x,y), & t>0, x,y \in \mathbb{P}^n(\mathbb{H}) \\ \lim_{t\to 0^+} \int_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})} H_n(t;x,y) f(y) dy = f(x), x \in \mathbb{P}^n(\mathbb{H}), & f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{P}^n(\mathbb{H})) \end{cases} . \qquad (H_n)$$

Pour énoncer les résultats principaux de cette Note, on fixera quelques notations qui seront utilisées par la suite. La distance géodésique $d_{FS}(x,y)$ sur $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$ est donnée par :

$$\cos(d_{FS}(x,y)) = \frac{\mid \sum_{i=0}^{2n+1} \overline{x_i} y_i \mid}{\mid x \mid \mid y \mid}, \quad x,y \in \mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C}). \tag{2.2}$$

La distance $d_{FS}(x,y)$ sur $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ est définie par :

$$\cos(d_{FS}(x,y)) = \frac{\mid \sum_{i=0}^{n} \overline{x_i} y_i \mid}{\mid x \mid \mid y \mid}, \quad x,y \in \mathbb{P}^n(\mathbb{H}). \tag{2.3}$$

Dans la suite on notera tout simplement $d(x,y)$. Pour $\alpha, \beta > -1/2$, $l \in \mathbb{N}$, $P_l^{(\alpha,\beta)}(x)$ désigne le polynôme de Jacobi de degrés l, $C_l^1(x)$ désigne le polynôme de Gegenbauer qui vérifie la relation $C_l^1(\cos(\theta)) = \frac{\sin(l+1)\theta}{\sin(\theta)}$. On note par π^* l'application qui à f associe $\pi^*(f) = f \circ \pi$. On désigne par L l'opérateur différentiel $L = -\frac{1}{\sin(u)} \frac{d}{du}$ et L^m le composé de L m fois et par $\theta_{2n+2}(t,u)$, $\Psi_m(t,u)$ les fonctions données réspectivement par :

$$\theta_{2n+2}(t,u) := \sum_{l=0}^{+\infty} e^{-4t(l+n+1/2))^2} \cos(2l+2n+1)u, \quad \Psi_m(t,u) = \sin(u) L^m[\theta_{2n+2}(t,u)]. \tag{2.4}$$

Le résultat principal de cette Note s'énonce comme suit :

Théorème 2.1. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Ecrivons $H_n(t,d) = H_n(t;x,y)$ avec $d := d(x,y)$ le noyau de la chaleur associé au Laplacien de Fubini-Study sur l'espace projectif quaternionique $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$, où d est la distance de Fubini-Study sur $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$. Alors, pour tout $t > 0$, le noyau $H_n(t,d)$ admet les deux représentations suivantes :*

$$i) \quad H_n(t;d) = \frac{e^{(2n+1)^2 t}}{2^{2n-2}\pi^{2n+1}} \int_d^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos^2(d) - \cos^2(u)}}{\cos^2(d)} \Psi_{2n+1}(t,u) du \tag{2.5}$$

$$ii) \quad H_n(t;d) = \frac{1}{\pi^{2n}} \sum_{l=0}^{+\infty} (2l+2n+1) \frac{(l+2n)!}{(l+1)!} e^{-4l(l+2n+1)t} P_l^{(2n-1,1)}(\cos(2d)), \tag{2.6}$$

où la fonction $\Psi_{2n+1}(t,u)$ est donnée par :

$$\Psi_{2n+1}(t,u) := \sin(u) \left(-\frac{1}{\sin(u)} \frac{d}{du} \right)^{2n+1} \Big(\sum_{l=0}^{+\infty} e^{-4t(l+n+1/2))^2} \cos(2l+2n+1)u \Big).$$

Avant de donner une esquisse de la preuve du théorème ci-dessus, on mentionne les remarques suivantes :

Remarque 2.2. *Les deux noyaux de la chaleur $H_n(t;d)$ et $Q_n(t;d)$ peuvent s'unifier dans une seule formule . En effet : Soient $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{H}$, et soit $2k$ la dimension réelle de $\mathbb{F}$ considéré comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ($k = 1$ ou 2) et $M_{n,k} = \mathbb{P}^n(\mathbb{F})$ et $\Delta_{n,k}$ le Laplacien de Beltrami sur la variété $M_{n,k}$ et*

$E_{n,k}(t,d)$ le noyau de la chaleur associé à $\Delta_{n,k}$. Alors $E_{n,k}(t,d)$ se met sous l'une des deux formes :

$$i)\quad E_{n,k}(t;d) = \frac{1}{\pi^{kn}}\sum_{l=0}^{+\infty}(2l+k(n+1)-1)\frac{(l+k(n+1)-2)!}{(l+k-1)!}e^{-4l(l+k(n+1)-1)t}P_l^{(kn-1,k-1)}(\cos(2d)) \tag{2.7}$$

$$ii)\quad E_{n,k}(t;d) = \frac{c(n,k)e^{(k(n+1)-1)^2t}}{\cos(d)^{2(k-1)}}\int_d^{\pi/2}\frac{-d(cos(u))}{(\cos^2(d)-\cos^2(u))^{3/2-k}}L^{k(n+1)-1}\left(\theta_{k(n+1)}(t;u)\right) \tag{2.8}$$

avec

$$c(n,k) = \frac{1}{2^{kn-2}\pi^{kn+1}},\quad \theta_{k(n+1)}(t;u) = \sum_{l=0}^{+\infty}e^{-4t(l+\frac{k(n+1)-1}{2})^2}\cos(2l+k(n+1)-1)u.$$

Remarque 2.3. *Le developpement du noyau de la chaleur $H_n(t;d)$ sur $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ donné dans ii) du Théorème 2.1 donne en effet la forme explicite du developpement établit, en terme de fonctions zonales, par (*[1, Remarque 2.1, P.270]*) du noyau de la chaleur de l'espace projectif quaternionique $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ vu comme espace homogéne .*

3 Méthode de démonstration du Théorème 2.1

Preuve de i). Pour commencer, rappelons tout d'abord que l'on a la fibration de Hopf :

$$(\mathbb{P}^1(\mathbb{C});ds^2_{FS}) \hookrightarrow (\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C});ds^2_{FS}) \xrightarrow{\pi} (\mathbb{P}^n(\mathbb{H});ds^2_{FS}). \tag{3.1}$$

Soit $u(t,x)$ la solution de l'équation de la chaleur associée à $\Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})}$ sur $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}u(t,x) = \Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})}u(t,x), & t>0, x\in\mathbb{P}^n(\mathbb{H}) \\ u(0,x) = f_0(x), & f_0\in\mathcal{C}^\infty(\mathbb{P}^n(\mathbb{H})) \end{cases} \tag{3.2}$$

Comme on a la formule d'entrelacement $\pi^*\circ\Delta_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})} = \Delta_{\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})}\circ\pi^*$ alors $(\pi^*u)(t,x)$ est la solution de l'équation de la chaleur associée au Laplacien $\Delta_{\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})}$ sur l'éspace projectif complexe $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$, donc en tenant compte de la formule integrale explicite du noyau de la chaleur $Q_{2n+1}(t;d(x,y))$ sur $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$ donnée dans l'équation (1) (voir [5]), on peut écrire :

$$(\pi^*u)(t,x) = \int_{\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})}Q_{2n+1}(t;d(x,y))(\pi^*f_0)(y)dy \tag{3.3}$$

où le noyau $Q_{2n+1}(t;d(x,y))$ est donné par :

$$Q_{2n+1}(t;d) = \frac{e^{(2n+1)^2t}}{2^{2n-1}\pi^{2n+2}}\int_d^{\pi/2}\frac{1}{\sqrt{\cos^2(d)-\cos^2(u)}}\Psi_{2n+1}(t;u)du. \tag{3.4}$$

En introduisant la fonction de Haiveside Y, le noyau $Q_{2n+1}(t;d)$ peut se mettre sous la forme :

$$Q_{2n+1}(t;d) = \frac{e^{(2n+1)^2t}}{2^{2n-1}\pi^{2n+2}}\int_0^{\pi/2}\frac{Y(u-d)}{\sqrt{\cos^2(d)-\cos^2(u)}}\Psi_{2n+1}(t;u)du. \tag{3.5}$$

Alors, en remplaçant dans l'équation (3.3) le noyau $Q_{2n+1}(t;d)$ par son expression ci-dessus et en permuttant les intégrales, la solution $(\pi^*u)(t,x)$ peut se mettre sous la forme :

$$u(t,\pi(x)) = \frac{e^{(2n+1)^2t}}{2^{2n-1}\pi^{2n+2}}\int_0^{\pi/2}T(u,x)\Psi_{2n+1}(t,u)du \tag{3.6}$$

où $T(u,x)$ est l'intégrale suivante :

$$T(u,x) = \int_{\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})}\frac{Y(u-d(x,y))}{\sqrt{\cos^2(d(x,y))-\cos^2(u)}}f_0(\pi(y))dy. \tag{3.7}$$

Pour $x = O = [1 : 0 : ....0] \in \mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$, en utilisant les mêmes téchniques utilisées dans ([2]), on ramene l'intégrale $T(u, O)$ à une intégrale sur $\mathbb{P}^n(\mathbb{H})$. En effet : si on désigne par $B_u(O)$ la boule de $\mathbb{P}^{2n+1}(\mathbb{C})$ de centre $O = [1 : 0 : 0....0]$ et de rayon u, l'intégrale $T(u, O)$ se met sous la forme :

$$T(u, O) = \int_{y \in B_u(O)} \frac{f_0(\pi(y))}{\sqrt{\cos^2(d(O, y)) - \cos^2(u)}} dy \tag{3.8}$$

et en utilisant le théorème de Fubini on a :

$$T(u, O) = \int_{z \in B_u(\pi(O))} \left(\int_{y \in \pi^{-1}(z)} \frac{dvol(\pi^{-1}(z))(y)}{\sqrt{\cos^2(d(O, y)) - \cos^2(u)}} \right) f_0(z) dz \tag{3.9}$$

et pour réduire l'intégrale $T(u, O)$ on paramétrise un voisinage de $O = [1 : 0 : ..... : 0] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ par :

$$z = [1 : \tan(\phi).q]; \quad \phi \in [0, \pi/2[; \quad q \in S^{4n-1} \subset \mathbb{H}^n \tag{3.10}$$

alors, tout élément y de $\pi^{-1}(z)$ est de la forme :

$$y = [\cos(v) : \sin(v)e^{i\theta} : \tan(\phi)q(\cos(v) + j\sin(v)e^{i\theta})]; \quad \theta \in [0, 2\pi]; v \in [0, \pi/2] \tag{3.11}$$

et la fibre $\pi^{-1}(z)$ s'identifie à $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ dont les variables (v, θ) sont les coordonnées radiale et angulaire respectivement, et l'on a :

$$dvol(\pi^{-1}(z))(y) = \sin(2v) dv d\theta/2 \tag{3.12}$$

et en utilisant les formules données par les équations (2.2) et (2.3) on a :

$$\cos^2(d(O, y)) = \cos^2(\phi)\cos^2(v), \quad \cos^2(d(O, z)) = cos^2(\phi), \tag{3.13}$$

et par un calcul direct on obtient :

$$\int_{y \in \pi^{-1}(z)} \frac{dvol(\pi^{-1}(z))(y)}{\sqrt{\cos^2(d) - \cos^2(u)}} = 2\pi \frac{\sqrt{\cos^2(\phi) - \cos^2(u)}}{\cos^2(\phi)}. \tag{3.14}$$

L'intégrale $T(u, O)$ se met alors sous la forme :

$$T(u, O) = 2\pi \int_{z \in \mathbb{P}^n(\mathbb{H})} Y(u - d(O, z)) \frac{\sqrt{\cos^2(d(O, z)) - \cos^2(u)}}{\cos^2(d(O, z))} f_0(z) dz. \tag{3.15}$$

Par conséquent, la solution $u(t, x)$ du probléme (H_n) évaluée en $O = [1 : 0 : 0.....0] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{H})$ s'écrit sous la forme :

$$u(t, O) = \frac{e^{(2n+1)^2 t}}{2^{2n-2}\pi^{2n+1}} \int_{\mathbb{P}^n(\mathbb{H})} \int_{d(O,z)}^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos^2(d(O, z)) - \cos^2(u)}}{\cos^2(d(O, z))} \Psi_{2n+1}(t, u) f_0(z) du dz. \tag{3.16}$$

Comme le noyau $H_n(t, x, y)$ ne dépend que de la distance géodèsique $d := d(x, y)$ on conclut que :

$$H_n(t; d) = \frac{e^{(2n+1)^2 t}}{2^{2n-2}\pi^{2n+1}} \int_d^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos^2(d) - \cos^2(u)}}{\cos^2(d)} \Psi_{2n+1}(t, u) du, \tag{3.17}$$

D'ou la formule i) du théorème.

Pour la preuve de ii) on remarque que :

$$\Psi_{2n+1}(t, u) = \sum_{l=0}^{+\infty} e^{-4t(l+n+1/2)^2} (2l + 2n + 1) \sin(u) L^{2n} \left(C^1_{2l+2n}(\cos(u)) \right). \tag{3.18}$$

Le noyau $H_n(t;d)$ se met alors sous la forme :

$$H_n(t;d) = \frac{e^{(2n+1)^2 t}}{2^{2n-2}\pi^{2n+1}} \sum_{l=0}^{+\infty} e^{-4t(l+n+1/2)^2}(2l+2n+1) \tag{3.19}$$
$$\times \int_d^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos^2(d)-\cos^2(u)}}{\cos^2(d)} L^{2n}\left(C^1_{2l+2n}(\cos(u))\right) sin(u)du.$$

Pour donner la formule ii) du théorème on a besoin du Lemme suivant :

Lemme 3.1. *Soient $n \in \mathbb{N}^*, l \in \mathbb{N}, 0 \leq d < \pi/2$, alors les polynômes de Jacobi du type $P_l^{(2n-1,1)}(cos(2d)))$ admettent une représentation intégrale réelle en terme des polynômes de Gegenbauer $C^1_{2l+2n}(\cos(u))$ et l'on a la formule suivante :*

$$\int_d^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos^2(d)-\cos^2(u)}}{\cos^2(d)} L^{2n}\left(C^1_{2l+2n}(\cos(u))\right) sin(u)du$$
$$= \frac{2^{2n-2}\pi(l+2n)!}{(l+1)!} P_l^{(2n-1,1)}(cos(2d)).$$

En utilisant le lemme ci-dessus, le noyau $H_n(t,d)$ se met sous la forme ii) du théorème :

$$H_n(t;d) = \frac{1}{\pi^{2n}} \sum_{l=0}^{+\infty} (2l+2n+1) \frac{(l+2n)!}{(l+1)!} e^{-4l(l+2n+1)t} P_l^{(2n-1,1)}(\cos(2d)). \tag{3.20}$$

Ceci termine l'esquisse de la preuve du Théorème 2.1.

Idée de la preuve du Lemme : Les polynômes de Jacobi du type $P_{l+1}^{(2n-2,0)}(2t^2-1)$ admettent une représentation intégrale réelle (voir [5]) :

$$P_{l+1}^{(2n-1,0)}(\cos(2d)) = \frac{2.(l+1)!(2n-2)!}{\pi(l+2n-1)!} \int_d^{\pi/2} \frac{-d(\cos(u)}{\sqrt{\cos^2(d)-\cos^2(u)}} C^{2n-1}_{2l+2}(cos(u)). \tag{3.21}$$

En appliquant des changements de variables dans la formule donnée dans l'equation (3.21) on obtient :

$$P_{l+1}^{(2n-2,0)}(2t^2-1) = \frac{2.(l+1)!(2n-2)!}{\pi(l+2n-1)!} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} C^{2n-1}_{2l+2}(ut)du. \tag{3.22}$$

Par dérivation par rapport à t et en faisant une intégration par partie, puis en faisant des changements de variables inverses, on établit la formule du Lemme.

Remerciements : Je tiens à remercier Mr Ahmed Intissar de la Faculté des Sciences de Rabat-Agdal pour les fructueuses discussions qu'il m'a accordées.

Références

[1] A. Benabdallah, Noyau de diffusion sur les espaces homogènes compacts. Bull. Soc. Math. France 101 (1973), 265–283

[2] Bunke Ulrich, Martin Olbrich and Andreas Juhl, The wave kernel for the Laplacian on the classical locally symmetric space of rank one, theta functions, trace formulas and the Selberg zeta function.ANNALS of Global Analysis and Geometry. Volume 12, Number 1, 357-405,DOI : 10.1007/BF02108307

[3] A. Debiard et B. Gaveau, Noyau de la chaleur pour certaines équations hypergéométriques et application aux espaces symetriques de rang 1, C.R. Acad. Paris, t. 303, Ser. I, n 17

[4] Gilkey, P.B. ; Leahy, J.V. ; Park, J., Spinors, spectral geometry, and Riemannian submersions. Lecture Notes Series, 40. Seoul National University, Research Institute of Mathematics, Global Analysis Research Center, Seoul, 1998. (http ://www.emc.dk/EMIS/monographs/GLP/)

[5] A. Hafoud et A. Intissar, Représentation intégrale de noyau de la chaleur sur l'espace projectif complexe $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$, $n \geq 1$. C.R. Math. Acad. Sci. Paris 335 (2002), no. 11, 871–876.

[6] S. Helgasson, Groups and geometric analysis : integral geometry, invariant differential operators, and spherical functions. Mathematical Surveys and Monographs, vol. 83. Academic Press, New York (1984).

[7] W. Magnus, F. Oberhettinger et R.P. Soni, Formulas and theorems for the special functions of mathematical physics. Third enlarged edition Springer-Verlag, Berlin Heidelbg New York 1966A.